

ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ В ГБУЗ «ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ДЗМ»

ВВЕДЕНИЕ : За последние десятилетия отмечается значительное увеличение выявляемости ПГПТ, в том числе за счет бессимптомных форм. Это обусловлено, прежде всего, активным внедрением определения уровня кальция в крови и ПТГ. Регистр ПГПТ в ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ» ведется с 2011г. В Эндокринологический диспансер из поликлиник направляются пациенты, преимущественно с манифестной формой, гиперкальциемическим вариантом заболевания, а также полиморбидной сопутствующей патологией для определения дальнейшей тактики ведения.

Цель: ежегодная оценка и анализ тенденций соотношения манифестной и бессимптомной форм ПГПТ, а также тактики ведения пациентов, находящихся под наблюдением в Эндокринологическом диспансере.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы данные регистра пациентов с ПГПТ с 2011 по 2022гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В 2011г. в Эндокринологическом диспансере наблюдалось 232 человека пациента с данной патологией. К 2022г. количество пациентов составило 597 человек, из них мужчин 19 человек (3,18%). На оперативное лечение в 2011г. направлено 40% пациентов, в 2016г. - 15%, в 2019г. - 23%, в 2022г. - 18%. С бессимптомной формой под наблюдением находились в 2011г. -19%, в 2016г. - 15%, в 2019г.- 15%, в 2022г.- 12%. Антирезорбтивную терапию получали в 2011г. -12%, в 2016г. - 37%, в 2019г. - 36%, в 2022г.- 41% пациентов, терапию цинакальцетом - в 2011г. - 29%, в 2016г. - 30%, в 2019г. - 26%, в 2022г. - 29%. Основные причины, по которым пациенты получают консервативное лечение при наличии показаний к оперативному лечению: 1) рецидив после первой операции и отказ от повторной операции – 15%; 2) аденома не обнаружена по результатам топоческой диагностики - 21%; 3) отказ от оперативного лечения – 30%; 4) тяжелые сопутствующие заболевания - 34%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. За период 2011-2022гг. отмечается уменьшение доли больных ПГПТ, которые получали оперативное лечение с 40% до 18%. Одновременно возросло количество пациентов, находящихся на антирезорбтивной терапии, с 12% до 41%. В последние годы отмечается тенденция к уменьшению доли пациентов с бессимптомной формой ПГПТ с 19% до 12% . Количество пациентов получающих цинакальцет увеличилось с 67 до 173 человек.

КОНТАКТЫ. Старыгина Ирина Евгеньевна, зав. специализированным отделением ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ»
Тел: +7(906)-755-79-22
E-mail: irina-star-irina@yandex.ru