



Осложнения со стороны височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с акромегалией

ВВЕДЕНИЕ

- Акромегалия – это орфанное нейроэндокринное заболевание, которое характеризуется медленным развитием клинической симптоматики, что приводит к поздней диагностике заболевания на моменте развития различных осложнений.
- Гиперпродукция соматотропного гормона, напрямую или опосредовано через ИФР-1, вызывает структурные изменения всех суставов, в частности височно-нижнечелюстного (ВНЧС) (Рис. 1). Данная патология может характеризоваться появлением боли, ограничения движения и существенно ухудшать качество жизни пациентов.




Рис. 1
МРТ височно-нижнечелюстного сустава. Внутрисуставной диск дегенеративен, деформирован, смещен кпереди и латерально, не участвует в разобщении суставных поверхностей.

Целью данного исследования является анализ осведомленности врачей различных специальностей о возможном нарушении функции ВНЧС у пациентов с акромегалией, необходимость прицельного расспроса о наличии боли, ограничения движения в ВНЧС и направления на консультацию к челюстно-лицевому хирургу. Также была проведена оценка мотивации у пациентов к реабилитации эстетических и функциональных параметров челюстно-лицевой области и возможность направления на медицинскую реабилитацию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опрос врачей различных специальностей с помощью анкетирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование дает представление о невысокой осведомленности врачей различных специальностей о нарушениях функции ВНЧС при акромегалии, редком активном расспросе о наличии жалоб со стороны ВНЧС при ограниченной возможности направить пациента на обследование к челюстно-лицевому хирургу и реабилитацию. Данные результаты лягут в основу совершенствования обследования пациентов на предмет осложнений со стороны ВНЧС и их дальнейшей маршрутизации к профильным специалистам и их реабилитации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- В опросе приняли участие 171 специалист, среди которых большую часть составляли врачи-эндокринологи (81,9%), также были задействованы стоматологи (7,6%), детские эндокринологи (4,7%), челюстно-лицевые хирурги (1,75%), врачи прочих специальностей (4,1%).
- 32,2 % опрошенных считают нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава серьезным осложнением, которое существенно влияет на качество жизни пациента.
- Специалисты отмечают, что 33,9% пациентов предъявляют активные жалобы на боли в ВНЧС. В то же время 34,5% врачей не опрашивают пациентов с акромегалией прицельно о наличии боли, ограничения движения в ВНЧС.
- При наличии жалоб не все специалисты (25,2%) направляют пациентов с акромегалией на консультацию к челюстно-лицевому хирургу, 71,9% считают организацию помощи пациентам с поражением ВНЧС недостаточной.
- По опыту опрошенных специалистов 29,2% пациентов с акромегалией заинтересованы в реабилитации эстетических и функциональных параметров челюстно-лицевой области, при этом только 11,1% опрошенных врачей имеют возможность направить пациентов с акромегалией на реабилитацию.

