


АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ 2023 ГОДА

Введение: Несмотря на 2% случаев рака щитовидной железы (РЩЖ) в структуре заболеваемости среди всех злокачественных новообразований, данная проблема продолжает оставаться актуальной ввиду роста агрессивных гистологических подтипов РЩЖ.

Цель исследования – изучить наиболее распространенные морфологические варианты РЩЖ в структуре заболеваемости населения Курской области по данным гистологического исследования операционного материала пациентов ОБУЗ КОНКЦ им. Г.Е. Островерхова за 2023 год.

Материалы и методы: Проанализировано 154 гистологических заключения пациентов с РЩЖ за 2023 год. Использованы методы математической статистики, обобщения и анализа полученных данных.

Результаты: Из 154 случаев РЩЖ соотношение женщин и мужчин составляет 6:1. В 86% случаев РЩЖ выявлен у женщин (132 пациентки), в 14% случаев у мужчин (22 пациента).



Контакты: darya_ovchinnikova_1995@mail.ru

Частота встречаемости различных морфологических подтипов рака щитовидной железы в определенных возрастных группах среди женщин Курской области

Папиллярный РЩЖ	
возрастные группы	количество пациенток
20-29 лет	4
30-39 лет	13
40-49 лет	25
50-59 лет	24
60-69 лет	37
70-79 лет	12

Фолликулярный РЩЖ	
возрастные группы	количество пациенток
20-29 лет	1
30-39 лет	2
40-49 лет	4
50-59 лет	2
60-69 лет	4

Медулярный РЩЖ	
возрастная группа	количество пациенток
70-79 лет	2

Анапластический РЩЖ	
возрастная группа	количество пациенток
60-69 лет	1

Частота встречаемости различных морфологических подтипов рака щитовидной железы в определенных возрастных группах среди мужчин Курской области

Папиллярный РЩЖ	
возрастные группы	количество пациентов
30-39 лет	1
40-49 лет	3
50-59 лет	2
60-69 лет	5
70-79 лет	2
80-89 лет	1

Фолликулярный РЩЖ	
возрастные группы	количество пациентов
30-39 лет	1
40-49 лет	0
50-59 лет	1
60-69 лет	1
70-79 лет	1
80-89 лет	1

Медулярный РЩЖ	
возрастные группы	количество пациентов
30-39 лет	1
60-69 лет	1

Заключение: В структуре заболеваемости женского населения Курской области в 2023 году лидировали высокодифференцированные морфологические варианты РЩЖ. Соотношение папиллярного РЩЖ к фолликулярному составило 9:1. Агрессивные морфологические варианты (медулярный и анапластический) выявлены в 2,3% случаев. В структуре заболеваемости мужского населения Курской области также преобладали высокодифференцированные морфологические варианты РЩЖ. Соотношение папиллярного РЩЖ к фолликулярному составило 3:1. Доля агрессивных вариантов (медулярный РЩЖ) составила 9%, что выше чем у женщин в шесть раз.